plus clair et lavé de jaune pâle surtout aux ailes inférieures. Pattes gris pâle.

Ile Maurice. 3 femelles.

Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle du *Migdolus Fryanus* Westw. [Col.]

Par E. Gounelle.

Le Prionien dont, au cours de mon dernier voyage dans l'État de Saõ Paulo (Brésil), j'ai donné, sous toutes réserves, une description provisoire (*Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1899, n° I, p. 6), n'est nouveau, ni comme genre, ni comme espèce.

Déjà M. Fairmaire avait fait justement remarquer que le genre *Paulistanus* était identique au genre *Migdolus* Westw. (*Bull. Fr.*, 8 févr. 1899, p. 39). M. Fry, possesseur de l'unique exemplaire connu jusqu'ici du *M. Fryanus*, seule espèce constituant le genre en question, ayant eu l'obligeance de me le communiquer, j'ai dû reconnaître également l'identité spécifique du *M. Fryanus* et du *M. Bourcieri*. L'exemplaire type, indiqué à tort par Westwood comme capturé aux environs de Rio, provient d'ailleurs aussi de l'État de Saõ Paulo, ainsi que M. Fry me le fait savoir.

La femelle seule était inconnue, en voici la diagnose :

Migdolus Fryanus (Westwood, *Journ. of Ent.*, II, p. 120) ♀.

Aptera, brunneo-ferruginea, elongato-globulosa; caput subverticale, scabrosum, flavo-pilosum; mandibulae perpendiculares, falciformes, intus dentatae, basi scabrosae, apice laeves; oculi parvi, transversi, non bunulati; antennae capite (cum mandibulis) paulo breviores, ante oculos et prope mandibularum basim insertae, 8-articulatae, art. 2° minimo, ultimo elongato, caeteris quasi subaequalibus, art. 1-4 nitidis grosseque punctatis, 5-8 leviter scabrosis; prothorax globulosus, levissime marginatus, lateraliter inermis, nitidus, tenue et sparsim punctatus; scutellum in apertum semiorbem circumactum; elytra scabrosa, parallela, convexa, sutura connata, marginata, prothorace paulo latiora, illoque circiter duplo longiora, apice rotundata; metasternum amplissimum et in medio profunde sulcatum; abdomen convexum, paulo elongatum, ultimo segmento elytra superante; pedes breves; femora lata, compressa; tibiae anticae intermidiaeque intus dentatae, posteriores inermes apice que valde dilatatae; tarsi 5-articulati, antici et postici breviores, art.

1° in modum trianguli elongati, 2° et 3° haud bilobatis, 4° minutissimo distincteque nodiformi. — Long. (*cum mandibulis*) 25-36 *mill., lat.* 10-12 *mill.*

Brésil : état de Saõ Paulo, vallée du Rio Pardo, affluent du Rio Paranapanema, décembre 1898; 4 exemplaires.

Diffère du mâle par l'absence d'ailes, par sa forme plus globuleuse, sa couleur plus rougeâtre, la brièveté de ses antennes de 8 articles au lieu de 11. Les yeux sont plus petits et non réniformes, le prothorax est plus globuleux, la forme de l'écusson en demi-cercle plus ouvert. Elle s'en distingue également par la convexité et la plus grande longueur de ses élytres qui sont soudées et sur lesquelles les 2 sillons très nets qui bordent la suture chez le mâle, à partir du premier tiers antérieur, sont indistincts; par l'ampleur et la convexité du métasternum et de l'abdomen, le pygidium dépassant les élytres; enfin les pattes antérieures sont plus courtes et les tarses antérieurs et postérieurs (surtout ces derniers) plus petits et plus grêles.

Les genres *Migdolus* et *Hypocephalus* sont placés à côté l'un de l'autre dans les catalogues: les divers caractères énumérés ci-dessus donnent à la femelle du *M. Fryanus* un faciès ayant beaucoup d'analogie avec celui de la femelle de l'*H. armatus*, ce qui confirme le bien fondé de ce rapprochement.

Dans ma description provisoire, j'ai dit que le *Migdolus* ♀ avait 9 articles aux antennes; cela est exact pour l'unique individu que j'avais alors entre les mains. Mais les deux femelles à antennes entières que je me suis procurées par la suite n'ont que 8 articles. De plus, en examinant de nouveau le premier exemplaire capturé, j'ai constaté que le 3e et le 4e articles de l'une des antennes étaient partiellement soudés, comme si le dédoublement de ce 4e article n'avait pu se faire que d'une façon incomplète. La variation du nombre des articles antennaires chez des Prioniens de même sexe et de même espèce développés normalement me paraissant assez improbable, je vois là simplement un cas tératologique qu'il m'a semblé nécessaire de faire connaître, mais dont je n'ai pas cru devoir tenir compte dans ma diagnose.

Note complémentaire sur *Tamiclea cinerea* Macq. [Dipt.]

Par le Dr J. Villeneuve.

J'ai donné, dans le *Bulletin* du 10 mai 1899 (p. 160), la synonymie qui se rapporte à cette intéressante Tachinaire. M. le Professeur Brauer,